

## Clasificación de Limitaciones (niños menores de 6 años)

### 1. Retrasos importantes para mantenerse sentado, de pie o empezar a caminar

Se considera que la edad normal de un niño para mantenerse sentado es de nueve meses, para mantenerse de pie es de doce meses y para empezar a caminar es de dieciocho meses.

### 2. Dificultades importantes para ver

### 3. Ceguera total

Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad para percibir cualquier imagen.

### 4. Dificultades importantes para oír

### 5. Sordera total

Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad para percibir cualquier sonido.

### 6. Dificultades para mover los brazos o debilidad o rigidez en los brazos

### 7. Dificultades para caminar o debilidad o rigidez en las piernas

**Debilidad** entendida como una falta importante de fuerza. Se refiere a aquellos niños que tienen gran dificultad para elevar brazos o piernas, para levantar objetos o para ponerse de pie, gatear, etc. como consecuencia, por ejemplo, de una distrofia muscular.

**Rigidez** en brazos o piernas. Se refiere a aquellos niños que tienen **continuamente** los músculos contraídos (agarrotados), con grave dificultad para relajarlos. Por ejemplo, un niño que presente continuamente los puños cerrados y muy apretados sin poder abrir la mano como consecuencia, por ejemplo, de lesiones del sistema nervioso (parálisis cerebral, etc.), presentará la limitación 6. Asimismo, un niño que se desplace continuamente de forma incoordinada (como consecuencia de la rigidez de los músculos de las piernas), presentará la limitación 7.

### 8. Ataques, rigidez del cuerpo o pérdida de conocimiento

**Ataque o convulsión.** Se refiere a aquellos niños que tienen contracciones violentas e involuntarias de los músculos voluntarios, a consecuencia de las cuales producen movimientos irregulares localizados o generalizados. Ejemplos de convulsiones crónicas o recidivas son las producidas por la epilepsia en algunas de sus variantes, tumores intracraneales, hipoglucemias o malformaciones, etc.

Se recogerán aquellos ataques que se han repetido en varias ocasiones y no aquellos otros que se hayan producido una única vez (convulsiones febriles, convulsiones por tétanos, etc.) y que con un tratamiento adecuado han remitido. Si la enfermedad que ha producido estas convulsiones,

que se han dado una sola vez, es importante y necesita cuidados o atenciones especiales, quedará recogida en la limitación 14.

## **9. Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad.**

## **10. Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído.**

Se considera que un niño está **alicaído** cuando **frecuentemente** se encuentra triste, deprimido, ausente, retraído, pasivo o excesivamente sumiso.

Se considera que un niño es **lento** cuando presenta lentitud en las respuestas a los estímulos físicos o psíquicos (afectividad, relaciones con otros niños de su edad o con sus familiares, etc.), ya que estos comportamientos pueden ser indicativos de enfermedades como autismos o retrasos mentales.

## **11. Dificultades para comprender órdenes sencillas**

Se refiere a niños que tienen dificultad para comprender órdenes sencillas, acordes con su edad.

Un niño de **2 años** debe saber contestar a la pregunta ¿cómo te llamas?, así como señalar objetos como un chupete, un abrigo, un vaso etc., cuando se le ordena.

Un niño de **3 años** debe conocer y decir su nombre, cuando se le pregunta.

Un niño de **4 años** debe saber contestar cuando se le pregunta qué hace, si tiene hambre o sueño.

Un niño de **5 años** debe saber contestar el uso que se da a determinados objetos (tenedor, cuchillo, cuchara, lápiz, muñecos, etc.)

## **12. Dificultad para nombrar un objeto**

## **13. Hablar con dificultad**

## **14. Problemas o enfermedades diagnosticadas que precisen de cuidados o atenciones especiales**

Se recogen en este apartado aquellos problemas que el niño lleva padeciendo 1 año o más o se espera que su duración sea superior a 1 año. Se refiere a aquellas limitaciones producidas por enfermedades como retrasos mentales, epilepsias, parálisis cerebral infantil, tumores, secuelas de enfermedades infecciosas (encefalitis, etc.), alteraciones metabólicas congénitas (fenilcetonuria, glucogenosis, hijos de madres diabéticas, etc.), trombosis, hemorragias cerebrales, etc.

