

Salud

4.9 Defunciones

Las estadísticas de causa de muerte proporcionan información sobre las enfermedades asociadas a la causa básica de defunción, así como una medición real del estado de salud de la población según sexo y edad. Analizando la evolución temporal en el número de defunciones se pueden valorar los resultados conseguidos por las políticas de salud y por las mejoras en los hábitos y estilos de vida de hombres y mujeres.

Estas estadísticas proporcionan información sobre la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, su distribución por sexo, edad, población de residencia y mes de defunción. Al conocer la causa básica de defunción se pueden conocer los riesgos de muerte asociados a determinadas enfermedades.

Las estadísticas de defunción también ofrecen indicadores que permiten realizar comparaciones geográficas y medir la mortalidad prematura mediante las tasas estandarizadas de mortalidad y los años potenciales de vida perdidos por grandes grupos de causas de muerte.

La incidencia y distribución por edad de la mortalidad presenta diferencias según sexo, la tasa de mortalidad global de los hombres sin tener en cuenta la edad es siempre más elevada. El porcentaje de muertes masculinas es significativamente más alto en la población joven. En edades muy avanzadas (de 90 y más años) la mortalidad femenina es significativamente más alta al ser superior el número de mujeres que alcanzan edades tan avanzadas.

En el año 2018 se produjeron 15.768 fallecimientos por causas externas (accidentes, suicidios, homicidios, caídas), 69 menos que en el año anterior (un 0,4%). Por sexo fallecieron un 0,3% menos de hombres que en 2017 y un 0,7% menos de mujeres.

Los recientes avances en la disminución de la mortalidad se han producido en edades avanzadas, lo que se ha traducido en aumentos significativos en los años de esperanza de vida a los 65 y a los 80 años.

Definiciones

Defunción

Es el fallecimiento de toda persona nacida viva, independientemente de las horas que haya vivido.

Causa de muerte

Se entiende por causa de defunción, el conjunto de todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de defunción

Enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. De las cuatro causas de defunción que deben figurar informadas en el boletín estadístico (inmediata, intermedia, inicial o fundamental y otros procesos), se selecciona para ser codificada la que se denomina causa básica, que generalmente coincide con la inicial o fundamental y sólo en los casos dudosos se recurre para su determinación a las reglas de selección establecidas por la Organización Mundial de la Salud en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

Mortalidad prematura. Número medio de años potenciales de vida perdidos

Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad que no es la habitual de defunción fijada teóricamente para ese colectivo. Es una medida de la mortalidad que teóricamente se podría evitar.

Comentarios**Defunciones según sexo, edad, causa**

En el año 2018, el 50,6% de las defunciones correspondieron a hombres. La incidencia de la mortalidad en hombres y mujeres depende del grupo de edad. La diferencia más significativa entre sexos se produce en el grupo de edad de 15 a 29 años, en el que un 70,1% del total de muertes correspondieron a hombres en el año 2018. En el tramo de edad de 90 y más años, al ser superior el número de mujeres que alcanzan edades avanzadas, la mortalidad femenina supera ampliamente a la masculina, correspondiendo el 67,6% de las defunciones a mujeres. Únicamente en este grupo de edad de 90 y más años, la mortalidad de las mujeres supera a la de los hombres en el año 2018.

En el año 2018, en las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de defunción (30,7%) y los tumores la segunda (21,1%). En hombres, por grandes grupos de causa de muerte, los tumores ocuparon el primer lugar (31,5%) y las enfermedades del sistema circulatorio (25,9%) el segundo.

Causas externas

La mortalidad por causas externas (accidentes, caídas, agresiones, suicidios, homicidios) es más alta en los hombres. En el año 2018 representaron el 43,2% del total de los fallecimientos en hombres y el 24,7% del total de defunciones en las mujeres.

A partir del año 2013 debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial se ha producido una mejora metodológica en la estadística de defunciones que ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. Como consecuencia, defunciones que estaban asignadas a causas mal definidas han sido reasignadas a partir del año 2013 a causas externas específicas.

El suicidio y las lesiones autoinfligidas se sitúan de nuevo en el año 2018 como la principal causa externa de muerte en hombres por el número de personas fallecidas. La tasa de suicidio (por 100.000 personas) en hombres fue de 11,4 en el año 2018. Los accidentes por ahogamiento, sumersión y sofocación junto con las caídas accidentales fueron la primera causa de muerte para las mujeres con una tasa de 6,1 para ambas causas. La segunda causa externa de muerte para los hombres en el año 2018 en número de fallecidos, fueron los accidentes por ahogamiento, sumersión y sofocación, la tasa por 100.000 habitantes fue de 7,4 en hombres.

Mortalidad prematura. Años potenciales de vida perdidos

En el año 2018 los hombres perdieron más años de su vida que las mujeres (14,2 años en los hombres y 13,5 en las mujeres) al fallecer a una edad que no correspondía con la edad teórica de defunción. Las causas de muerte que dan lugar a las cifras más altas de años potenciales de vida perdidos en los hombres son: afecciones originadas en el período perinatal (47,9 años perdidos); malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (31,4 años); causas externas de mortalidad (27,8 años); síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (20,4 años).


En mujeres, la mortalidad prematura que origina las cifras más altas de años potenciales de vida perdidos corresponde a las siguientes causas: embarazo, parto y puerperio (45,4 años), afecciones originadas en el período perinatal (41,4 años), malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (32,1 años), causas externas de mortalidad (23,3 años).

Gráficos y enlaces a las tablas

Defunciones según grupos de edad (% población)

	2018		2017		2016	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	50,6	49,4	50,5	49,5	50,9	49,1
De 0 a 14	56,0	44,0	56,4	43,6	58,1	41,9
De 15 a 29	70,1	29,9	68,8	31,2	68,9	31,1
De 30 a 44	65,0	35,0	65,0	35,0	65,1	34,9
De 45 a 59	66,7	33,3	66,4	33,6	67,0	33,0
De 60 a 74	67,5	32,5	67,3	32,7	67,8	32,2
De 75 a 89	50,6	49,4	50,5	49,5	50,5	49,5
De 90 y más	32,4	67,6	32,0	68,0	31,9	68,1

Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Defunciones según grupos de edad. 2018
(% de población)

Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Defunciones según causas de muerte más frecuentes (% total de muertes)

	2018		2017		2016	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Todas las causas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tumores	31,5	21,1	32,0	21,3	32,8	22,0
Enfermedades del sistema circulatorio	25,9	30,7	26,2	31,5	26,5	32,0
Enfermedades del sistema respiratorio	13,5	11,6	13,2	11,1	12,5	10,2
Enfermedades del sistema digestivo	5,2	5,0	5,0	4,7	5,1	4,7
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4,8	7,6	4,7	7,7	4,7	7,7
Causas externas de mortalidad	4,6	2,8	4,6	2,8	4,7	2,9
Trastornos mentales y del comportamiento	3,5	7,0	3,5	6,8	3,4	6,9
Otras causas	3,3	4,5	3,4	4,7	3,3	4,6
Enfermedades del sistema genitourinario	2,8	3,7	2,7	3,5	2,6	3,4
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2,7	3,6	2,6	3,6	2,6	3,6
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	2,2	2,5	2,1	2,3	1,8	2,1

Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Defunciones según causas de muerte más frecuentes.
Año 2018 (% total)



Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Tasas de mortalidad por causas externas. 2018 (por 100.000 habitantes)

	Hombres	Mujeres
Total	43,2	24,7
Accidentes de tráfico	6,3	1,9
Otros accidentes de transporte	0,8	0,1
Caídas accidentales	7,4	6,1
Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	7,1	6,1
Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,4	0,2
Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,1	1,0
Otros envenenamientos accidentales	0,5	0,2
Otros accidentes	5,1	3,9
Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,4	3,9

Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Número medio de años potenciales de vida perdidos según la causa de muerte

	2018		2017		2016	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	14,2	13,5	14,3	13,6	14,3	13,5
Afecciones originadas en el periodo perinatal	47,9	41,4	35,2	33,0	37,9	46,1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	31,4	32,1	34,8	29,2	32,0	31,7
Causas externas de mortalidad	27,8	23,3	28,0	23,4	27,4	23,3
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	20,4	17,3	20,1	17,9	19,7	17,4
Enfermedades infecciosas y parasitarias	16,4	14,3	17,0	14,1	17,8	13,8
Enfermedades sangre y de órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	15,6	14,8	16,3	14,0	16,6	14,4
Enfermedades del sistema digestivo	14,8	12,3	15,4	12,9	15,2	11,9
Tumores	13,3	15,1	13,4	15,3	13,4	15,3
Enfermedades del sistema circulatorio	13,2	10,4	13,0	10,3	13,0	10,0
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	13,1	11,5	13,2	11,2	13,5	11,1
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	12,4	10,4	12,1	10,1	12,6	10,1
Enfermedades del sistema respiratorio	10,7	11,0	10,4	10,4	10,6	10,7
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10,7	10,6	12,0	11,0	11,5	11,7
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,5	8,7	9,7	7,8	11,3	8,7
Trastornos mentales y del comportamiento	8,8	7,1	8,4	6,7	8,8	7,1
Enfermedades del sistema genitourinario	8,5	8,3	9,2	8,7	9,2	8,1
Embarazo, parto y puerperio		45,4		44,0		43,5

Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Número medio de años potenciales de vida perdidos. 2018



Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Fuentes

Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE

Más información

Datos nacionales y autonómicos

[Estadística de defunciones según la causa de muerte. INE](#)

[Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social](#)

Datos europeos

Indicadores de igualdad (edad y género). Eurostat

World health organization WHO. Europe

Causes of death. Eurostat

Base de datos de European Institute for Gender Equality (EIGE)

Datos OCDE

OECD. Health Statistics 2017

Datos de las Naciones Unidas

Estadísticas de Género. Salud y mortalidad. Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE)

Datos de otros organismos internacionales

Base de datos Europea de Salud para Todos (HFA). Organización Mundial de la Salud (OMS)

Sistema de Información Estadística (WHOSIS). Organización Mundial de la Salud (OMS)